浅田飴せきどめ og オレンジ味 24錠



植咳去痰薬 6錠×4スティック

₩ โてはいけないこと

「守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなり ないでください。他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬

相談すること

い。(1) 医師の治療を受けている人(2) 妊婦又は妊娠していると思わ れる人(3)授乳中の人(4)高齢者(5)薬などによりアレルギー症状を

■用法・用量

次の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用してくださ い。服用間隔は2時間以上おいてください。

ĺ	年齢	1回量	服用回数
	大人(15才以上)	3錠	
	8才以上15才未満	2錠	1日6回
- [5才以上8才未満	1錠	
ı	5 少 去 浩	服田! たいこと	

副作用救済制度 0120 -149 -931

- ※1度に3錠又は2錠を口中に含まず、1錠ずつなめてください。
- ●定められた用法、用量を厳守してください。●小児に服用させ る場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

小使用上の注意

起こしたことがある人(6)高勢のある人(7)心臓病、高血圧、糖尿病、甲状 腺機能障害の診断を受けた人

- ます。] 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用し、2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があります ので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録 販売者にご相談ください。「皮膚)発疹・発赤、かゆみ「消化器〕叶き気・ 嘔叶、食欲不振「精神神経系」がまい
- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談くださ、3.5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この 製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

■効能・効果

せき、喘鳴(ザーザー、7,40-7,40-1)をともなうせき、たん、のどの炎症による 声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

■成分・分量 18錠中

成分	分量
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	37. 5mg
クレゾールスルホン酸カリウム	135mg
セチルピリジニウム塩化物水和物	3mg

添加物として環元水アメ、環元麦芽糖水アメ、グリチルリチン酸2K、アセスルファムK、 コハク酸2Na、DL ーリンゴ酸、アラビアゴム、カルナウバロウ、カラメル、D-ソルビトー ル ボリソルベート80 1ーメントール タルク サラシミツロウ シリコーン樹脂 ソルビタン 脂肪酸エステル、グリヤリン脂肪酸エステル、繊維素グリコール酸Na. 香料含有

製造販売元

東京都東村山市久米川町5**-**29-7 ●お問合せ先 お客様相談室

雷託 03-3953-4044 時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く) ■保管及び取扱い上の注音

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管し てください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。 (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因に なったり品質が変化します)。(4)使用期限を過ぎた製品は 服用しないでください。